Nos. 66.

Amputation d'une Tumeur en apparence Enkistée, située dans La région Epigastrique, et formée par L'Epiploon; observation communiquée a Lacademie Royale de Chirurgie par m. Desgranges maitre ès arts et en Chirurgie a Lyon

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Jean françois Charaud, natif de paris, paroisse St Etienne du mont, agé de 19 ans, d'une constitution Délicate, etant apprentif maréchal forgeur en 1769 a la Salpetrière, et travaillant a des ouvrages de force superieures aux siennes, se rompit, et eut une descente de Boyau a Droit, qui descendait, disait il, jusques dans le scrotum, et quil faisoit remonter aisément. un Bandage bien adapté quil porta une année de suite le guérit parfaitement, et la Descente ne reparut plus. 15 mois aprés etant aux guinguettes, il prit dispute avec quelques camarades qui le renversèrent violemment au travers d'un Banc. Les vertébres Dorsales portaient sur le Banc, tandis que le reste du corps n'etait point appuyé, et il fut cruellement maltraité dans cette attitude Douloureuse, bien faite pour produire un Ecartement dans les fibres tendineuses et aponévrotiques qui par leur entrelassement constituent La Ligne blanche. peu de jours aprés Charaud s'apperçut en effet d'une petite tumeur de la grosseur d'une noisette qui se montra tout a coup au dessus du nombril, Laquelle disparoissait souvent d'elle meme dans

ARC 57
no 125

de Certaines attitudes du corps. et Surtout a la moindre préssion.
il y fit d'abord peu d'attention; cette tumeur augmenta
insensiblement, et acquit plus de volume. il Eprouvait des
coliques de temps a autre qu'il faisait cesser en se couchant
sur le ventre, quoique la tumeur ne rentra plus: alors il
sentait une douleur et une gene considerable a la région de
l'Estomac. Lorsqu'il toussoit ou se mouchoit, cela repondait
a cet endroit, et le fatiguait beaucoup. Enfin les incommodités
qu'il Eprouvait, et la Delicatesse de sa constitution, le
Déterminèrent en 1771, a changer d'Etat, il prit le métier
de Chapelier.

Charaud Etait toujours Souffrant, la tumeur
Continuait a croitre, lentement a la vérité, et a mesure que
ses Dimensions augmentaient, il se trouvait fatigué d'avantage
lorsqu'il avait mangé. ainsi se sont Ecoulées six années
dans des alternatives de souffrance et de bien etre, jusqu'au
mois de 1776. qu'étant a Lyon, a la suite d'une partie
de plaisir ou ce jeune homme avait beaucoup chanté, la
tumeur lui parut s'accroitre encore, il y ressentit une
douleur déchirante, des picottemens, et une chaleur acre,
accompagnés d'un mal aise a la région Epigastrique, et d'un
tiraillement de l'Estomac difficiles a Exprimer. il Eut de la
fievre, et quelques vomissemens, ce qui le decida a se rendre a
l'hotel dieu, Le 13. Janvier.

J[illegible]

La tumeur etoit circonscritte, assés egale, du volume d'une pomme reinette, situee comme je l'ai dis, mais un peu inclinée a gauche, molle comme les loupes graisseuses, mais sans fluctuation sensible, les tégumens de couleur naturelle, un peu plombés a gauche . . .
on aurait pris volontiers cette tumeur pour une concretion skirrheuse, une tumeur froide formée par congestion, ou du genre des lupiftes, mais les informations que nous primes, les signes commémoratifs, et les accidens présens ne nous permettoient pas de douter que ce fut un Epiploïcele . . .

On procéda a l'opération peu de jours après, on cerna la tumeur avec un Bistouri, et on la souleva pour l'enlever et découvrir son pédicule interne et la portion d'Epiploon qui passait a travers l'ecartement de la ligne blanche. — le pedicule ne résista pas; cette toile graisseuse, molle et macérée en cet endroit permit d'enlever la tumeur, sans la couper ni la delier, (de pédicule). — a peine pouvoit on introduire l'extremité du petit doigt dans le trou qui luy avait donné passage, et la portion d'Epiploon, etoit blanche, comme filamenteuse, et désorganisée . . . . . — La Cure ne fut troublée par aucun accident pendant quelque tems, il sortit par l'ouverture Epigastrique un pus bourbeux, epais, baiseux, qui changea ensuitte de nature. L'aponevrose decouverte s'exfolia, rougit, et la Cicatrice ne tarda pas a se former.

J'examinais attentivement La tumeur enlevée en présence de plusieurs maitres en Chirurgie convoqués pour assister a cette opération. sa figure

tenait un peu de Lovale, ayant une poche lisse et unie recouverte par la peau qu'on y avait laissé, mais sa partie postérieure, ou celle qui posait sur la Ligne blanche étoit percée d'un trou rond du diamètre de celuy remarqué aux parties contenantes de l'abdomen, et a cet endroit répondait la portion d'Epiploon qui resta sur le ventre, filandreuse, après l'enlèvement de la tumeur. J'ouvrais cette dernière, elle ne renfermait que de l'epiploon enduri, skirrheux, partagé en plusieurs Lobules fort épais et fondues en quelques endroits. Du coté droit les feuillets de l'Epiploon etoient plus reconnoissa-bles, mais partout ailleurs, ils étoient désorganisés, en partie décomposés, et en fonte, y ayant a gauche du sang, de la graisse ensemble liquéfiés .... Nous ne pumes nous assurer si le sac ou le Kiste étoit formé par le peritoine, ou par l'application successive des feuillets ou lames du tissu cellulaire rapprochés, condensés, &c....

M.

8. 8bre 1780